inO FLOW - Mg500

ACTION DURABLE

ENGRAIS CE - Suspension d'hydroxyde de Magnésium

COMPOSITION

MgO	500 g/L

CARACTÉRISTIQUES

Formulation	Suspension concentrée avec co-formulants
Utilisation	Foliaire
Conditionnement	5 L (5L x 2, palette 600L)
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel
Conservation du produit	18 mois
Effet acidifiant sur la bouillie	pas d'effet
Forme	Liquide - (SC)
Densité	1,41

INTÉRÊTS AGRONOMIQUES

Rôles des éléments

Magnésium :

- Photosynthèse
- Synthèse des glucides et lipides

Caractéristiques

inO FLOW - Mg500 prévient et corrige les déficiences en Magnésium de toutes les cultures par application foliaire.

inO FLOW - Mg500 garantit des hauts niveaux de rendement et améliore la qualité des productions. Il apporte le Magnésium sous une forme liquide fortement concentrée et efficace.

inO FLOW - Mg500 est un produit liquide prêt à l'emploi et polyvalent.

Intérêts de la formulation

- **Durabilité d'action :** solubilité et libération progressive des éléments.
- **Apport concentré en élément nutritif :** permet d'apporter la quantité nécessaire en une seule fois assurant une dose en éléments nutritifs suffisante pour couvrir les besoins des cultures.
- **Utilisation lente des sels par la plante :** permet une anticipation/prévention des carences.
- **Produit non agressif pour les feuilles :** aucun risque de brûlure sur feuilles même à des concentrations élevées.
- **Solubilité élevée** et utilisation à faible volume d'eau/ha.
- Associé à des agents mouillants, collants et humectants pour augmenter la qualité de pulvérisation et limiter le lessivage des éléments sur les feuilles.

MODE D'EMPLOI

Principales cultures		Doses /ha	Concentration maximale d'utilisation	Périodes d'application
	Vigne	1-2 L	2%	**Traitement précoce avant floraison** - Dose 1-2L/ha par application. **En prévention du dessèchement de la rafle** : fermeture, véraison et 1 mois avant vendange jusqu'à 4 L/ha. **En prévention de la chute prématurée des feuilles :** à partir du stade grossissement du fruits Dose : 2 à 4 L/ha par application **Dans le cas de carence grave** sur fruits à pépins commencer avant floraison.
	Arbres fruitiers	2-4 L		
	Pommes de terre			Une semaine après l'émergence, à renouveler 21 jours plus tard.

Principales cultures		Doses /ha	Concentration maximale d'utilisation	Périodes d'application
	Betterave	2-4 L	2%	dès le stade 4 feuilles
	Melon			Pour lutter contre la grillure - Stades : 3 apports dès les premières nouaison et tous les 10 à 15 jours.s
	Tabac			2 apports de mi-juin à fin juillet

CONSEILS PRATIQUES

Préparation de la bouillie

Pour une efficacité optimale, utiliser un volume d'eau / ha suffisant pour obtenir une répartition homogène sur l'ensemble du feuillage sans ruissellement. Préférer les traitements aux températures comprises entre 6 et 25 °C.

- Agiter le bidon pour homogénéisation.
- Verser progressivement le produit, une fois la cuve à moitié remplie d'eau et le système d'agitation en marche.
- Rincer l'emballage deux fois.

En cas de mélange avec d'autres produits, effectuer toujours un test préalable et incorporer ce produit après les formulations poudres.

inO NUTRITION